



Cebo Gel Hormiguicida

Composición

Sulfloramida	1,00 g.
Bitrex	0,005 g.
Atractantes e inertes c.s.p.	100 g.

HORMIXAN® GEL es una jeringa con cebo gel hormiguicida a base de Sulfloramida y compuestos especiales y aminoácidos esenciales en la dieta de las hormigas, que lo convierten en un cebo altamente palatable.

HORMIXAN® GEL controla hormigas presentes en el hogar incluyendo a la hormiga carpintera o arara (*Camponotus sp.*), hormiga de fuego (*Solenopsis sp.*), hormiga argentina (*Iridomyrmex humilis*) y hormiga faraónica (*Minimorium pharaonis*) transmisora de enfermedades.

HORMIXAN® GEL posee efecto domino, multiplicando el rendimiento del producto.

HORMIXAN® GEL se mantiene palatable y activo durante varias semanas y sus cualidades de cebo se reactivan en presencia de la humedad ambiente, volviéndose atrayente como el primer día de aplicación. Su formulación se adhiere a cualquier superficie.

Listo para Usar

Para Uso Profesional y Doméstico

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) N° P- 452/11

Presentación jeringa de 6 grs.

Fabricado por: Punch Química S. A.

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cía. Ltda. AGROAMBIENTE®
Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Teléfono: (02) 2274 4989
Santiago – Chile.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.

Efecto Domino

HORMIXAN® GEL es ingerido y transportado por las hormigas obreras y estas una vez en el nido, dan de comer el producto a otras obreras, a la reina y a las larvas. Estas últimas digieren el cebo y producen un líquido que contiene la Sulfloramida, con el que también se alimentan interrumpiendo el metabolismo eliminando así la colonia.

HORMIXAN® GEL se emplea en casas de familia, centro de salud, restaurantes, casas de comidas, panaderías, industrias, oficinas, hoteles, comercios, depósitos, salas de espectáculos y exteriores e interiores de domicilios.

HORMIXAN® GEL tiene una toxicidad moderada en mamíferos y contiene Bitrex, un disuasivo alimentario de sabor sumamente desagradable que previene la ingestión humana involuntaria.



Cebo Gel Hormiguicida

Forma de Aplicación

Quitar la tapa de y presionar lentamente para dosificar el producto en forma de líneas de no más de 3 cm. y 3 mm de diámetro (0.120 g.). Aplicar dos líneas por m² sobre las superficies, grietas o fisuras donde transitan las hormigas. De ser factible lo más próximos a sus nidos, usualmente ubicados en áreas húmedas y tibias cerca de fuente de comida o agua.

Después de la aplicación se incrementara la presencia de hormigas en busca de **HORMIXAN GEL** y dentro de los 7 días se producirá una reducción o su extinción.

Dosis de Aplicación

PLAGA	BAJA INFESTACIÓN	ALTA INFESTACIÓN
Hormiga	2 Líneas X m2.	4 Líneas X m2.

Recomendaciones de Uso

- Procure no interrumpir los senderos de las hormigas ya que algunas especies pueden rechazar el producto.
 - No toque el producto después de aplicado ni las hormigas alrededor del cebo ya que las mismas dejan de ingerir y transportar **HORMIXAN® GEL** al hormiguero, alertando al resto de la colonia.
 - Aplicar en lugares sombríos evitando que quede en contacto con luz solar para evitar la deshidratación del producto.
 - No aplicar en los lugares que generalmente se ven afectados por una constante limpieza como ser mesas o superficies donde se preparan alimentos.
 - No aplicar insecticidas en spray en las áreas tratadas con cebo **HORMIXAN® GEL** ni fume durante su aplicación porque reduce la atractividad del cebo.
 - Aplicar en lugares secos.
 - Si el problema de hormigas sigue presente deberá recomendar a los vecinos el uso del sistema **HORMIXAN® GEL**.
 - Verifique bloquear todas las vías de acceso.
- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
 - **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
 - **EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
 - **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.**
 - **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
 - **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

En caso de INTOXICACIÓN, llamar a:

– CITUC/ AFIPA (atención las 24 horas): (02) 2635 3800.

Santiago – Chile.

