

Raticida Bloques Piramidales

Composición

Bromadiolone 0,005 gr.
Colorante, atractivos y bitrex c. s. p. 100 gr.

TERMIXAN® PLUS es raticida anticoagulante monodósico, a base de Bromadiolone. Posee una excelente palatabilidad, controlando una amplia variedad de roedores. Rápida acción sobre roedores resistentes a warfina. **TERMIXAN® PLUS** contiene cera siliconizada altamente resistente a condiciones adversas (humedad y temperatura)

TERMIXAN® PLUS con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que se produce por vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

TERMIXAN® PLUS presenta una forma de bordes múltiples que resulta atractiva para el roedor por sus hábitos de morder. Los bloques tienen un orificio central que facilita su fijación con mayor seguridad.

TERMIXAN® PLUS es un producto, según la OMS, clase toxicológica IV (producto que normalmente no ofrece peligro).

TERMIXAN® PLUS para mayor seguridad contiene Bitrex, un disuasivo alimentario para la ingesta involuntaria humana.

TERMIXAN® PLUS tiene antídoto: Vitamina K1

Listo para usar

Uso profesional, pecuario y doméstico

Autorización del Instituto de Salud Pública (ISP) N° P-453/11

Presentación envases de 1 kilo bloques de 10 y 20 grs.

Fabricado por: Punch Química S. A.

Importa y Distribuye: Carlos Salas y Cia. Ltda.

Manuel Antonio Maira 1011-R, Providencia – Telefono: (2) 2274 4989
Santiago – Chile.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.

PLAGA	APLICACION
RATAS	De 2 a 8 bloques a intervalo de 4 a 9 mt.
RATONES	1 bloque cada 2 a 4 mt.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Conservar **TERMIXAN® PLUS** en su envase original.
- Usar guantes para su manipulación.
- No comer, beber ni fumar durante la aplicación.
- Enterrar o eliminar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.
- Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de ingestión, NO provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: 02-2635 3800** , las 24 horas.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K 1 (Fitomenadiona oral o inyectable)**

ACCIÓN TÓXICA

- Bromadilone es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MASCOTAS, AVES Y/ O PERSONAS NO RESPONSABLES.**
- **ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LEER TODA LA ETIQUETA.**
- **EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.**
- **MANTENER EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO.**
- **NO ALMACENAR JUNTO CON ALIMENTOS.**
- **TRANSPORTAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL, CERRADO Y EN LUGAR SEGURO.**

En caso de INTOXICACION, llamar a:

– CITUC (atención las 24 horas): (02) 2635 3800.

Santiago – Chile.

