



Insecticida

Amplio espectro de acción insecticida



Uso profesional, público y pecuario.

Insecticida residual organofosforado para el control de insectos y ácaros en Granos Almacenados, Salud Pública y Sanidad Ambiental.

Granos Almacenados

- Está especialmente recomendado para aplicación directa sobre el grano y superficies inertes en bodegas y silos de acopio.

Salud Pública y Sanidad Ambiental

- Evaluado exitosamente por la OMS (WHOPES) para el control de larvas y adultos de mosquitos vectores de enfermedades.
- Insecticida clave para Programas de Manejo de Resistencia a Insecticidas Piretroides.
- Recomendado para exteriores en industrias, planteles animales y viviendas en el control de insectos voladores y rastreros.



Ingrediente activo: Pirimifos-metil al 50%

Formulación: Concentrado Emulsionable (EC)

RECOMENDACIONES DE USO

Uso	Plaga	Dosis	Observaciones
GRANOS ALMACENADOS	Al grano (aplicación directa)	8 - 20 cc / ton. de granos en 200 a 500 cc de agua	Aplicación directa al grano: • Aplicar como aspersión, a medida que el grano ingresa en los silos. • Usar la dosis mayor para obtener una protección de hasta 8 meses.
	Bodegas * (paredes, pisos, vigas, otros)	50 cc / 5 L agua para 100 m ²	Aplicación para granos ensacados: • Pulverizar la superficie de los sacos, en lo posible capa por capa, en la medida que éstos se apilan.
		100 cc / 5 - 10 L agua para 100 m ²	Previo a la aplicación, las bodegas deben limpiarse a fondo, eliminando los desechos de sacos, etc.
SALUD PÚBLICA	TRATAMIENTO RESIDUAL SÓLO EXTERIORES (casas, edificios, bodegas, packings, planteles de aves y cerdos, lecherías, etc.)	100 cc / 5 - 10 L agua para 100 m ²	• Si la superficie es muy porosa (adobe, madera, ladrillo u otras) utilizar 8 a 10 litros de agua.
	CONTROL DE LARVAS *	50 cc / 5 L agua para 50 m ²	• Aplicar sobre aguas estancadas no potables. • Aplicar sobre estiércol o basurales. • Repetir la aplicación a las 4 horas y luego cada 12 días.
	TRATAMIENTO ESPACIAL* Termoniebla (interior)	100 cc / 100 L de agua para 1 ha	
		50 cc / 1 L de solvente o agua para 1000 m ³	• El solvente puede ser petróleo, parafina o agua, lo que dependerá del equipo de aplicación. • Ventilar mínimo 12 horas antes de reingresar.
	Termoniebla (exterior)	200 a 400 cc / 2 L de solvente o agua para 1 ha	• El solvente puede ser petróleo, parafina o agua, lo que dependerá del equipo de aplicación.
	400 cc / 2 L de solvente o agua para 1 ha		

*Tiempo de reingreso: para aplicaciones en espacios cerrados, no reingresar antes de las 12 horas de efectuada la aplicación.

