


# icon<sup>®</sup>10WP

Insecticida

Excelente acción en condiciones difíciles



## Uso profesional

- Insecticida piretroide polvo mojable (WP) de prolongado efecto residual.
- Especialmente recomendado para el control de insectos vectores de enfermedades como mosquitos y vinchucas.
- Indicado para superficies porosas o con materia orgánica.
- Destaca su acción sobre el escarabajo del estiércol en plantales de aves y garrapata café del perro en exteriores de viviendas\*.
- Avanzada presentación en Bolsas Solubles en Agua (BSA), que permite una mayor seguridad del operador, mejor dosificación y manejo del producto.



\*Nota: en garrapata café del perro, no aplicar directamente en el animal.

Ingrediente activo: Lambdialotrina al 10%

Formulación: Polvo Mojable (WP)



### RECOMENDACIONES DE USO

Plaga	Uso	Dosis	Observaciones
Vinchucas Mosquitos	- Interior / Exterior campanas públicas en casas e instalaciones rurales o urbanas.	50 g / 10 a 15 L de agua para 150 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la infestación es alta aplicar la solución en 100 m<sup>2</sup>.</li> <li>• Especial atención en grietas, hendiduras y detrás de cuadros y muebles.</li> <li>• Ventilar al menos 2 a 4 horas antes de reingresar.</li> </ul>
Moscas Zancudos Garrapatas Avispas Pulgas Tijeretas Arañas Otras	- Exterior plantales animales, industrias, packing, otros.  - Exterior programas de manejo de resistencia a ins. Piretroides.	50 g / 10 a 15 L de agua para 250 m <sup>2</sup>  50 g + 125 cc de Actellic 50 EC / 10 a 15 L de agua en 250 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para manejo de resistencia a insecticidas piretroides, utilizar <b>ACTELIC 50 EC</b></li> <li>• Mantener permanente agitación del tanque pulverizador.</li> </ul>
<i>Alphitobius diaperinus</i>	- Cama de broiler.	50 g / 10 a 15 L de agua para 150 - 200 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar una vez, antes de ingresar las aves.</li> <li>• Especial atención a pilares, vigas y estructuras.</li> <li>• Ventilar al menos 2 a 4 horas antes de reingresar.</li> </ul>